


定期予防接種の標準的な受け方【令和7年度版】




ワクチン	年齢(月齢)		1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳
	1か月後	6か月後	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳
ロタウイルス ※いづれかを 選択して接種	ロタリックス (1価)	24か月後		②						
	ロタテック (5価)	24か月後		①	②					
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※5種混合接種時は不要	初回接種	生後2か月～7か月に接種を開始。 27日～56日の間隔において3回接種		③						
	追加接種	初回3回目の接種後、7か月～13か月の間隔を おいて1回接種			③					
小児用肺炎球菌	初回接種	生後2か月～7か月に接種を開始。 27日以上の間隔において3回接種		③						
	追加接種(生後12か月以降に接種)	初回3回目の接種後、60日以上の間隔を おいて1歳～1歳3か月未満に1回接種			③					
B型肝炎	1回目	1回目から27日以上の間隔において接種		①						
	2回目	1回目から27日以上の間隔において接種		②						
4種混合 (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・ポリオ) ※5種混合接種時は不要	1期初回	20日～56日の間隔を おいて3回接種		①						
	1期追加	1期初回3回目の接種後、 1年～1年半の間隔を おいて1回接種			③					
5種混合 (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・ポリオ・ヒブ)	1期初回	20日～56日の間隔を おいて3回接種		①						
	1期追加	1期初回3回目の接種後、 6か月～1年半の間隔を おいて1回接種			③					
B C G										
麻疹・風しん	1期	1歳を過ぎたら早めに接種 しましょう		①						
	2期	2歳を過ぎたら早めに接種 しましょう			②					
水ぼうそう	1回目接種	1歳～1歳3か月未満に 接種		①						
	2回目接種	1回目接種後、6か月～1年 の間隔を おいて接種			②					
日本脳炎	1期初回	3歳～4歳未満に、6日～28日 の間隔を おいて2回接種			①					
	1期追加	初回2回目の接種後、概ね1年 後に1回接種			②					

1回目は生後
14週6日後までに接種。

接種可能な期間
標準的な接種期間

●この表は、7歳6か月未満までの定期予防接種の受け方の一例として作成したものです。実際の受け方については、接種医にご相談ください。
●それぞれのワクチンは、接種可能な期間内であれば、無料で接種できます。
※定期予防接種を受けるには、接種日時時点でさいたま市に住民登録がある等、一定の条件を満たすことが必要です。



令和7年度 定期予防接種一覧

予防接種の必要性をよく理解し、お子さんの体調のよい時に受けましょう。

接種対象者	次の2つの条件を満たす方 ①接種日時時点でさいたま市に住民登録のある方 ②接種日時時点で対象年齢内の方	必要な物	①各ワクチンの予診票 ②母子健康手帳 ③マイナ保険証（健康保険証） ④子育て支援医療費受給資格証、心身障害者医療費受給資格証、ひとり親家庭等医療費受給資格証 ⑤お子さんがさいたま市民であることを確認できる書類（健康保険証、個人番号カード等）
接種場所	さいたま市定期予防接種実施医療機関		
接種費用	無料		

■定期予防接種の種類・対象年齢・回数・接種方法

種類	接種対象年齢	接種回数		接種方法 ※標準的な受け方は裏面をご覧ください。	
		接種開始時年齢			
ロタウイルス ※いずれかを 選択して接種	ロタリックス(1価)	出生6週0日後～24週0日後	1回目は出生6週0日後～ 出生14週6日後まで	2回 27日以上の間隔を置いて2回接種	
	ロタテック(5価)	出生6週0日後～32週0日後		3回 27日以上の間隔を置いて3回接種	
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※5種混合接種時は不要	生後2か月～5歳未満	生後2か月～ 生後7か月未満	初回3回 追加1回	1歳未満までに、27日以上の間隔を置いて3回接種 初回接種後、7か月以上の間隔を置いて接種	
		生後7か月～ 1歳未満	初回2回 追加1回	1歳未満までに、27日以上の間隔を置いて2回接種 初回接種後、7か月以上の間隔を置いて接種	
		1歳～5歳未満	1回	—	
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満	生後2か月～ 生後7か月未満	初回3回 追加1回	2歳未満までに、27日以上の間隔を置いて3回接種 初回接種後、60日以上の間隔を置いて、1歳以降に接種	
		生後7か月～ 1歳未満	初回2回 追加1回	2歳未満までに、27日以上の間隔を置いて2回接種 初回接種後、60日以上の間隔を置いて、1歳以降に接種	
		1歳～2歳未満	2回	60日以上の間隔を置いて2回接種	
		2歳～5歳未満	1回	—	
B型肝炎	1歳未満	—	2回 1回	27日以上の間隔を置いて2回接種 2回接種後、1回目から139日以上（20週間後の接種日と同じ曜日以降）の間隔を置いて1回接種	
		—	初回3回 追加1回	20日以上の間隔を置いて3回接種 初回接種後、6か月以上の間隔を置いて1回接種	
ジフテリア・百日せき・ 破傷風・ポリオ（4種混合） ※5種混合接種時は不要	生後2か月～7歳6か月未満	—	初回3回 追加1回	20日以上の間隔を置いて3回接種 初回接種後、6か月以上の間隔を置いて1回接種	
ジフテリア・百日せき・破傷風・ ポリオ・ヒブ（5種混合）	生後2か月～7歳6か月未満	—	初回3回 追加1回	20日以上の間隔を置いて3回接種 初回接種後、6か月以上の間隔を置いて1回接種	
ジフテリア・破傷風 第2期	11歳～13歳未満	—	1回	—	
BCG	1歳未満	—	1回	—	
麻しん・ 風しん	第1期	1歳～2歳未満	—	1回	—
	第2期	幼稚園・保育園の年長児相当	—	1回	【平成31年4月2日生～令和2年4月1日生】 ※令和7年4月1日～令和8年3月31日の間に接種
水痘（水ぼうそう）	1歳～3歳未満	—	2回	3か月以上の間隔を置いて2回接種	
日本脳炎	第1期	生後6か月～7歳6か月未満	—	初回2回 追加1回	6日以上の間隔を置いて2回接種 初回接種後、6か月以上の間隔を置いて接種
	第2期	9歳～13歳未満	—	1回	—
ヒトパピローマウイルス (HPV)	小学校6年生～ 高校1年生相当の女子	—	3回	■2価ワクチン【サーバリックス】 2回目：1回目から1か月以上の間隔を置いて接種 3回目：1回目から5か月以上かつ、2回目から2か月半 以上の間隔を置いて接種 ■4価ワクチン【ガーダシル】 2回目：1回目から1か月以上の間隔を置いて接種 3回目：2回目から3か月以上の間隔を置いて接種	
		15歳未満	2回	■9価ワクチン【シルガード9】※接種開始が15歳未満 2回目：1回目から5か月以上の間隔を置いて接種	
		15歳以上	3回	■9価ワクチン【シルガード9】※接種開始が15歳以上 2回目：1回目から1か月以上の間隔を置いて接種 3回目：2回目から3か月以上の間隔を置いて接種	

生ワクチン [注射]	●麻しん・風しん混合 ●麻しん ●風しん ●BCG ●水痘（水ぼうそう） △おたふくかぜ	27日以上あける	生ワクチン [注射]
---------------	---	----------	------------

●：定期予防接種（無料） △：任意予防接種（有料）

※ロタウイルスワクチンは生ワクチンですが、注射ではなく、経口（口から飲む）接種です。

西 区役所保健センター	TEL 620-2700	FAX 620-2769	桜 区役所保健センター	TEL 856-6200	FAX 856-6279
北 区役所保健センター	TEL 669-6100	FAX 669-6169	浦和区役所保健センター	TEL 824-3971	FAX 825-7405
大宮区役所保健センター	TEL 646-3100	FAX 646-3169	南 区役所保健センター	TEL 844-7200	FAX 844-7279
見沼区役所保健センター	TEL 681-6100	FAX 681-6169	緑 区役所保健センター	TEL 712-1200	FAX 712-1279
中央区役所保健センター	TEL 840-6111	FAX 840-6115	岩槻区役所保健センター	TEL 790-0222	FAX 790-0259